

羔羊断尾技术

黄 玲

辽宁省北票市农业科技指挥中心办公室, 辽宁北票 122100

摘要 辽宁省北票市肉羊养殖发展很快, 养殖技术不断提高, 近年来羔羊断尾技术不断普及, 本文从品种、天气、日龄、断尾方法、断尾位置和消毒 6 个方面对羔羊断尾技术进行阐述。

关键词 辽宁北票; 羔羊; 断尾技术

辽宁省北票地区肉羊品种有小尾寒羊、滩羊的杂一代、萨福克等, 根据肉羊养殖现状, 为了提高养殖效益, 近年来羔羊断尾技术在北票地区得以推广和普及。

1 品 种

大脂尾和短脂尾的羊不断尾, 主要是越冬储存能量和母羊增加泌乳需要大脂尾。细长尾巴的最好断尾, 以小尾寒羊为母本的、以大脂尾和短脂尾羊为母本的杂交羊选择再靠下一点位置, 比较好断。

2 天 气

选择晴天的早晨断尾。因为早上羔羊吃奶的频率高, 大羊奶水也足, 断尾后羔羊疼痛厉害, 约 10 min 内麻木后便好, 让羊羔找母羊, 在断尾后最好吃奶, 这样才能防止羔羊有更大的应激反应。阴天断尾容易感染。

3 日 龄

选择 7~10 日龄为宜。单羔的, 初生重超过 5 kg 的, 最早在 4 日龄即可。双羔的, 羔子较小较弱的, 15 日龄也可以断尾。实践证明 3 月龄以前的羔羊都可以断尾。

4 断尾方法

羔羊断尾有烧烙法, 也有止血钳法, 最好选择用胶圈, 也可用橡皮筋或者自行车的气线, 圆管型

的不容易出现伤痕, 一定要选择弹性好的, 紧紧缠绕在尾巴上同一位置 3 圈并系牢; 弹性不好的或者没有系牢, 更容易肿胀感染。

5 断尾位置

断尾的位置一般选择 3~4 尾椎之间, 种公羊可以在第 2 尾椎后。以大脂尾或者短脂尾的羊为母本杂交的, 要选择在第 5 尾椎上较好。

6 消 毒

建议在断尾前羊舍带羊消毒, 断尾时不用消毒。羊舍没有消毒的, 可以用酒精给断尾处消毒。但用碘酊消毒会大大降低橡胶筋的弹性, 断尾效果不好。在 10~15 d, 尾巴自行脱落后, 要用碘酊彻底消毒, 有污染的先用双氧水清洗后消毒, 把橡胶筋和尾巴清理后深埋处理。断尾时要把尾巴外层的皮肤尽量向尾巴根部撸起来, 这样尾巴断了后, 外皮肤会很好的包住伤处, 以后也很少感染; 还有就是保姆性差的、双羔的、多羔的、弱羔的在断尾时要单圈饲养观察 1 d, 不要造成不必要的损失。

经过断尾的母羊长大后易于交配, 更便于人工授精, 如小尾寒羊 × 滩羊的杂一代等。因为滩羊、改良后的杂一代羊一般都是先把尾巴的脂肪灌满, 然后才长身上的肉, 断尾后就会避免这一不利因素, 有利于育肥。并且羔羊断尾后可改进皮下脂肪及肌间脂肪含量, 提高羊肉品质, 减少羊膻味, 还可以避免粪便污染羊毛。所以羔羊断尾技术的普及对提高养殖户的经济效益非常重要。

收稿日期: 2017-05-08

黄 玲, 女, 1984 年生, 畜牧师。