

山区农村散养鸡的疫病防控

廖海洋

福建省清流县畜牧兽医水产局,福建清流 365300

摘要 山区农村散养鸡是户外放牧散养,开放性大,给鸡的疫病防控带来一些困难,如何做好散养鸡的疫病防治措施,有效防控疫病的发生,是亟待解决的问题。笔者通过采取综合措施进行防治,取得成效。

关键词 农村;散养鸡;疫病;防治;措施

山区农村散养鸡由于其饲养方式是户外放牧散养,开放性大,给鸡染病、传病提供了潜在因素,也给鸡的疫病防控带来一些困难,如不加强防控,一旦发病蔓延造成大量死亡,将给群众造成重大经济损失,也会给群众的生命健康带来危害。笔者工作在闽西北山区农业县,从事动物疫病预防控制工作,所在地部门采取综合措施进行防治,取得理想成效,现将经验报告如下。

1 做好宣传、培训、指导及咨询工作

1)宣传。充分利用广播、电视、墙报、黑板报、宣传单等普及鸡疾病防控知识,宣传饲养管理知识,让群众掌握和了解鸡疾病防控及饲养管理知识,提高防控意识,主动做好鸡疫病防治工作,积极和主动配合做好鸡疫病防疫工作。

2)培训。采取面对面,田间学校、明白纸、课堂教学、播放电视等方式,向群众传授鸡传染病、普通

病及中毒防治、鸡饲养管理等知识,使他们掌握鸡饲养与疫病防治知识,利用所学知识做好鸡饲养与疫病防治工作。

3)指导。要求专业技术干部充分利用各种机会与场合,向养鸡户传授鸡饲养与疫病防治知识,指导他们做好鸡饲养与疫病防治工作。

4)咨询。将有关专业技术人员的电话,制成明信片,分发给养鸡户,以便他们随时进行电话咨询,及时解决遇到的鸡饲养与疫病防控难题。

2 做好免疫工作

1)春秋季节集中免疫。根据工作计划安排,每年春秋季节定期组织防疫小队,拉网式做好鸡集中免疫工作,对集中免疫期间不能与未能免疫的鸡,及时做好补免工作。

2)市场免疫。对于群众从市场买回家饲养的鸡,由专业技术人员在市场进行相关病种免疫注

收稿日期:2015-04-10

廖海洋,男,1960年生,高级兽医师。

节或季节交换阶段,应注重青绿饲料和维生素的及时供给,增强羊群抵抗力,避免营养缺乏及气候突变造成的不良影响。

5.3 紧急预防接种,及时隔离病羊及带菌羊

此次病例中,养殖户起初发现病羊,没有及时隔离和就医,以致疫情扩散;同时,其胡乱用药,不但没有起到治疗的作用,反而延误了治疗的最佳时期。因此,养殖户一旦发现羊群表现异常,应立即将该群体进行隔离,并给全群羊只紧急接种传染性胸膜肺炎疫苗,同时加强观察,出现病症的羊只应及

早确诊、及时治疗,以免造成更大的损失。

6 治疗

使用新肿凡纳明(也称914)进行治疗,成年羊0.20~0.25 g,幼龄羊0.10~0.15 g,使用灭菌生理盐水稀释成5%的溶液,1次静脉注射。由于2只羊病情严重,虚脱而亡;其它病羊疗效明显,体温和食欲逐渐恢复,精神状态转好,咳嗽减轻。第5天再注射1次新肿凡纳明,用量稍减,不再有羊只发病,羊群状态基本恢复。

射,并做好登记工作,以便跟踪进行未免病种免疫工作。

3)月月补针。对于新补栏和新孵的鸡,要求群众及时向村级防疫员报告,由村级防疫员每月统一安排时间对全村未免的鸡进行补免。

4)鸡苗供应户的免疫。对于鸡苗供应户,按时对其供应的鸡苗进行免疫注射,并告知其没有免疫的鸡苗,不要投放市场交易,以免增加鸡的免疫难度。

3 疫病防治

1)药物预防性治疗。指导群众根据鸡的每个生长阶段发病规律,投喂相关药物进行药物预防。

2)病鸡治疗。要求群众在鸡的养殖过程中,一旦发现鸡出现异常情况,要及时报告,及时诊断,及时发现问题,及时采取措施进行治疗处理。

4 做好其他工作

1)档案。严格按照动物防疫档案要求,认真扎

实做好防疫档案,向养殖户发放《动物免疫证》,以便使动物防疫有档案可查。

2)巡查。充分利用下村入户入场的机会,做好动物防疫巡查工作,发现漏免的,及时补免。

3)检测。每年定期对散养鸡的免疫抗体进行检测,对免疫抗体检测不达标的鸡,及时进行重免。

4)卫生与消毒。指导养鸡户,认真做好鸡养殖场所的卫生清扫与消毒工作,保持清洁卫生,以消除疫病潜在因素。

5)引进鸡苗。宣传教育群众,购买鸡苗时,要在专业人员指导下购买健康的鸡苗,不到疫区和可疑区域购买鸡苗与成鸡,以防买到病鸡,将疫病传入。

6)无害化处理。宣传教育群众,发生鸡不明原因死亡情况时,要及时进行无害化处理,并对污染场地进行清扫消毒处理,以防疫病进一步扩散蔓延。

夏天养禽六注意

- 1) 畜禽养殖场舍要尽量建在地势高燥、平坦的地方,不要建在山谷洼地等易受洪涝威胁的地段。
- 2) 大雨过后,及时排除积水,并打开门窗加强通风。
- 3) 严禁外来车辆进入生产区。必须进入的车辆要进行彻底消毒,同时,要严格控制人员外出流动。
- 4) 严格消毒。场舍外面可用 3%~5%的火碱每周喷洒 1 次地面。舍内粪便要及时清理,并用 5%漂白粉、3%百毒杀、火碱、过氧乙酸等定期消毒。对食槽、水槽等饲具要经常清洗消毒,保持清洁卫生。
- 5) 注意防蚊、灭鼠。畜禽被蚊虫叮咬后易发传染病,如奶牛焦虫病、猪乙型脑炎、鸡白冠病等。对场区内的杂草,要及时清除;场舍门窗应钉上纱网,避免蚊虫、野鸟飞入;饲料中添加杀虫卵的药物,并在蚊蝇较多的地方喷洒药物。
- 6) 科学喂养。提高饲料中的营养成分,适当多喂一些蛋白质、维生素、矿物质含量高的饲料,并保证供给充足、清洁的饮水;不喂发霉变质的饲料。

来源:中国饲料原料信息网