

肉羊的饲养管理技术要点

乔清亮¹ 王远丽²

1.新疆维吾尔自治区吉木萨尔县泉子街镇畜牧兽医站,新疆吉木萨尔 831700;

2.新疆维吾尔自治区昌吉州畜产品质量安全检测中心,新疆昌吉 831100

摘要 做好肉羊养殖必须注入现代养殖技术。分别介绍了羔羊、育成羊、种公羊、母羊的饲养管理技术要点。

关键词 肉羊;饲养管理;技术要点

当前,随着肉羊杂交改良技术的运用,肉羊养殖已被广大养殖户所接受,肉羊养殖成为增加农牧民收入的一项经济来源。做好肉羊养殖必须注入现代养殖技术。

1 羔羊饲养

1)及时吃足初乳。羔羊出生后 2~4 h 以内,要尽快吃到初乳。

2)适时断乳、去势。羔羊在生后 10~15 d,要训练羔羊吃草吃料,促进前胃发育,先以青干草为主,以后以碾碎的玉米、豆粕为主。羔羊出生 60~90 d 后,要把母仔分开断奶,使母羊早日恢复体质,锻炼羔羊的独立性。羔羊应在断奶前去势,越早越有利于恢复。

3)对缺奶羔羊或失去母羊的羔羊,要找母性强的保姆羊,将保姆羊的羊奶或者尿液涂在寄养羔羊

的身上,使母羊难以辨认而进行哺乳。也可用奶粉或者消毒的牛、羊奶进行人工哺乳,做到定时、定温、定量。

4)做好羔羊的保健。北方冬季寒冷,要注意羔羊的保暖,防止贼风进入羔羊圈舍,夏季要防暑降温,注意通风。羔羊合理哺乳,加强运动,增强体质。保持舍内干燥,清洁卫生。

2 育成羊饲养

1)分群管理。按照公母、大小、体质强弱进行分群管理,及时转群饲养。按照不同的情况来调配饲料。

2)防疫与驱虫。制定科学的免疫程序和预防接种;90 日龄进行第 1 次驱虫及免疫接种,必要时在 135 日龄进行第 2 次驱虫。按照免疫程序进行免疫接种及驱虫。

收稿日期:2015-04-03

乔清亮,男,1978 年生,兽医师。

养,寄养前,要让羔羊吃足初乳,再进行寄养。

2.5 补饲精料

为了满足羔羊生长发育的需要,羊群每天收牧后,要给羔羊补饲一些精料,如全价颗粒饲料、麦皮、玉米等。

2.6 做好羔羊疫病防控工作

1)做好羊舍卫生。对有产羔羊的羊舍,要坚持每天对粪便及污物进行清扫,清扫后的粪便及污物堆积进行发酵处理。每周对羊舍进行 1 次消毒。

2)给羔羊喂食预防药物。羔羊出生后,对原有发生过羔羊痢疾的羊场,出生 3 d 后,每天要给羔

羊喂食土霉素片等,以预防羔羊痢疾等肠道疾病的发生。

3)做好羔羊疫病免疫工作。在羔羊饲养过程中,要依照羊疫病免疫程序,及时对羔羊进行相关疫病的免疫注射,除传染性胸膜肺炎外,其余病种要根据周边的疫情来确定。

4)做好病羊救治工作。在羔羊饲养过程中,要坚持每天查看羔羊的健康状况,以便及时发现异常与发病的羔羊,一旦发现羔羊发病,要及时采取措施进行治疗处理,将疫病控制在萌芽状态,以最大限度降低羊场损失。

3)粗饲料搭配要多样化,每天日粮中蛋白含量达到 15%~16%,平均精料饲喂量要达到 0.4 kg,此外,还有注意钙、磷、食盐、微量元素的补充。

4)饲喂大量优质的干草,每头羊要有充足的日照和运动,促进消化系统的发育。

5)一般育成羊在满 8~10 月龄,体质量达到 40 kg 或者达到成年羊的体质量 65%以上时,适时配种。育成母羊发情不明显,要配一只试情公羊,提高配种率。

3 种公羊饲养

1)种公羊饲料的营养价值要高,容易消化,适口性好,保证种公羊每日能采食到多种多样足量的青粗饲料。在配种期间应给以豆饼、鸡蛋等富含蛋白质的饲料,还要补给富含矿物质的饲料,以保证营养需要。

2)种公羊每天包括放牧在内要有 6~7 h 的运动时间。

3)注意掌握配种次数,一般日配种或采精 1~2 次,个别健康的种公羊最多日配种或采精 3 次为宜。

4 母羊饲养

4.1 空怀母羊和后备母羊

以青粗饲料为主,对个别体质较差的母羊,适当增加精料,有利于母羊集中发情。空怀母羊要抓膘复壮,体况恢复到中等以上,以利配种。

及时调整羊群繁殖状况,对发育好的后备母羊,适当早期配种延长母羊的生殖年限,一般 8~14

个月进行初配。对 6 岁以上老龄母羊及生长发育差、哺乳性能不好的母羊及时淘汰。

配种前期补饲催情。配种前 2~3 周,保证青饲料的供应,对母羊进行短期补饲。每只每天喂混合精料 0.5~1.4 kg。

4.2 妊娠期

母羊妊娠期为 5 个月,前 3 个月为妊娠前期,后 2 个月为妊娠后期。妊娠前期胎儿发育缓慢,只要饲喂营养均衡、鲜嫩可口的青粗饲料即可满足,补饲如同空怀期。妊娠后期胎儿发育迅速,需要抓好母羊膘情。在保证优质粗饲料供应的同时,补给一定量的配合精料。

饲养管理重点是抓膘、保胎。前期要防止早期流产,后期要防止母羊受伤害或发生早期流产,避免羊吃冰冻饲料和发霉变质的饲料。不饮冰渣水,防止羊受惊和拥挤。母羊在预产前 1 周,可放置于产房内饲养,一来熟悉环境,二来有利于分娩。

4.3 哺乳期

哺乳期为 2.5~3 个月。母羊产后,及时恢复体力,要补饲温盐水或在温盐水中加一些麸皮,促进母羊产后恶露的排出。产后 3 d 内,母羊膘情好,只需饲喂一些优质干草,不要饲喂精料和多汁料,以免造成消化不良或乳房炎。膘情不好的根据实际情况补饲。产羔 3 d 之后,可饲喂少量的混合精料和多汁料,逐渐达到哺乳期的饲喂量。根据当地气候状况及时更换母羊垫草,保持圈舍干燥。

在羔羊断奶前 1 周,母羊要减少多汁料、青贮料和精料的喂量,防止断奶时发生乳房炎。

如何给腹泻犊牛补充体液

犊牛腹泻是引起脱水和酸中毒最常见的重要原因,体液疗法是矫正脱水和电解质紊乱,恢复牛体机能的重要手段。腹泻犊牛在禁食期间,可饮服糖盐水,以补充体液。方法是把烧开灭菌的温水,在每升水中加入 2 汤匙白糖和 2~3 g 食盐,溶化后饮牛,不限量,自由饮用。能及时补充因腹泻而失去的水分和盐,还能促进肠道废物和毒素的排出。如能饮牛口服液盐(取盐 3.5 g、小苏打 2.5 g、氯化钾 1.5 g、糖 20 g 溶于 1 000 mL 水中),补充和调节电解质平衡,解毒和治疗奶泻的效果更好。

来源:肉牛养殖网