

规模化猪场母猪产后护理

赵俊红

山西省侯马市畜牧兽医中心,山西侯马 043000

摘要 母猪经过分娩后,机体抵抗力会下降,易产生疾病,做好产后母猪的护理工作至关重要,本文主要对规模化猪场产后母猪检查、体力恢复、喂养及保健护理等方面进行探讨。

关键词 规模化猪场;产后母猪;护理

随着市场对猪产品需求的增加,规模化养猪场也不断增多。母猪繁殖生产是否顺利,会直接影响到猪场的盈利及长远发展。母猪分娩后,猪场养殖管理人员应加强产后母猪的保健护理,以预防产后疾病,帮助母猪尽快恢复。以下是对猪场产后母猪保健护理技术的分析。

1 产后母猪的检查

母猪产出仔猪后,应先对母猪的胎盘进行检查,确认是否排出。若胎盘排出困难,应给予适量催产素进行肌肉注射,以利于胎盘娩出。然后仔细查看母猪乳房有无红肿,若存在红肿症状,多为乳房炎,必须及早治疗;最后,密切留意母猪产后动态,如子宫与产道是否损伤,损伤程度是否严重^[1]。若存在炎症,应及时进行消炎治疗,避免疾病进一步发展。

2 环境控制

母猪分娩后,应及时将其胎衣清除干净,并取

新草垫在地上;同时,使用温肥皂水将其后躯与阴部擦拭干净,或者也可使用高锰酸钾溶液,但必须为温水,防止母猪受凉^[2]。注意保持猪舍的干燥、整洁,控制好猪舍温度,一般在 20~23℃左右为宜。注意保持猪舍内的安静,防止噪声过大而使母猪受到惊吓,影响内分泌或造成泌乳困难。

3 产后母猪的体力恢复

母猪临产前一般会停止饮水,但生产期间会消耗掉大量体力,故母猪产后极易疲劳与口渴。此时,应及时为其补充能量,可给予 1%生理盐水、电解质、多维水等,若恢复情况较差,可给予直接输液补液。另外,母猪产后 3 d,可将其赶出猪舍进行适量的户外运动,以增强机体抵抗力,并给予一定量微量元素,促进母猪机体恢复。

4 产后母猪的喂养

母猪产完仔猪后,身体机能往往较差,此时极

收稿日期:2016-10-30

赵俊红,女,1972年生,兽医师。

豁、霍×豁 2 个组产毛量极显著地高于另外 3 组,但两者之间产毛量差异不显著($P > 0.05$)。含绒率测

定结果,除了朗×豁显著低于各组外,各组差异均不显著。

表 6 F1 代 100 日龄活体拔毛统计

组别	产毛量/g	含绒率/%
狮×豁	53.4a	45.6a
朗×豁	46.0b	33.2b
霍×豁	53.3a	46.1a
皖×豁	41.0b	39.4a
豁鹅纯繁	40.3b	39.2a

4 小 结

综上各单项测定结果分析,狮×豁、霍×豁 2 个杂交组合的繁殖力、F1 代肉用和羽绒性能俱佳。朗×豁杂交组合 70 日龄体重最高,但其繁殖力及羽绒性能偏低。因此认为“狮×豁”、“霍×豁”可作为肉绒兼用配套系在生产中推广应用。

可能出现代谢障碍。所以,产后 6~8 h 内,应不予喂食饲料,然后再逐步满足营养需要,以适应胃肠的消化功能。次日起,给予优质、容易消化的谷类饲料,并尽可能将饲料制作成稀粥状,促进消化。2 d 后,消化功能恢复较快的母猪,可给予正常饲料喂食。产后 3~5 d,注意适当增加饲料量,保障产奶量的充足以满足哺乳需要。

5 产后常见问题与护理

1)产后不食。产后母猪拒食的情况较为多见,常表现为体温低、眼黏膜苍白、四肢发凉、不走动等,若未能及时处理,极可能造成母猪死亡^[3]。如果是因机体原因发生的不食,可将 7~10 mL 氢化可的松、20 mL 的 V_C 溶于 100 mL 的 50%葡萄糖形成溶液,然后静脉注射,1 次 /d,连续使用 2~3 d。

2)咬仔。母猪产后,咬仔的情况也经常发生,原因主要有饥饿过度或者营养不良,多出现于初产或饥饿过度的母猪;母性不好,存在吃仔恶癖,主要是生产期间未能饮水而导致烦躁^[4]。应注意满足怀孕母猪的饲养需求,保证营养均衡。产前,保证母猪水分充足。认真做好接产工作,及时将分娩现场、死胎与胎衣清理干净,防止母猪吞食。仔猪应采用圈养模式,不可串圈。取适量的母猪乳汁或尿液涂于仔猪身上。

3)拒哺。初次分娩的母猪,因为缺乏哺育经验,在仔猪吃奶时会出现紧张、恐惧情绪而拒绝哺乳。针对这种情况,养殖人员协助仔猪慢慢接触母猪腹部,防止仔猪争夺奶头而惊吓到母猪,并留意母猪

的哺乳情况。对于初产母猪,应在怀孕后期对其乳房进行按摩,帮助母猪尽早养成产后哺育的习惯。除此之外,若母猪患乳房炎,则会出现乳房肿胀的情况,仔猪触及其乳头后会产生疼痛而拒绝哺乳,此时应及时给予抗生素治疗。

4)产后瘫痪。产后,母猪如果出现四肢瘫痪、突发性肌肉松弛与昏迷等症状,应警示这是一种代谢性疾病,临床特征以低血钙为主。护理措施:给予 200 mL 的 10%葡萄糖静脉注射,1 次 /d,连续应用 2~3 d。同时,给予强心、纠正电解质与酸碱平衡治疗。

6 小 结

在母猪繁殖生产中,产后护理是非常关键的工作。产后护理工作是否到位,会直接影响到母猪产后恢复及仔猪生长与发育,直接关系到猪场的效益。所以,加强母猪产后护理,对预防产后母猪疾病及促进母猪恢复,具有重要意义。

参 考 文 献

- [1] 任小明,何晶晶,张胜,等.产后母猪保健技术对规模化猪场繁殖生产影响对比试验报告[J].育种繁殖,2015(1):44-45.
- [2] 王齐奖,何勃,何爱双,等.规模猪场分娩母猪的饲养管理关键技术[J].中国畜禽种业,2016(6):93-94.
- [3] 李大秋.规模化猪场母猪产后护理关键技术[J].今日畜牧兽医,2016(1):37-38.
- [4] 连慧香.规模化猪场产后母猪的保健护理技术探讨[J].猪业科学,2015(8):120-121.

给家禽打针注意事项

腿部打针不要打内侧。因为禽类腿上的主要血管神经都在内侧,在这里打针易造成血管、神经的损伤,出现针眼出血、瘸腿、瘫痪等现象。

皮下打针不要用粗针头。粗针头打针因深度小、针眼大,药水注入后容易流出,且容易发炎、流血。因此,皮下注射特别是给仔鸡注射时要用细针头,注射油苗可以用略粗一点的针头。

胸部打针不能竖刺。给仔禽、雏禽打针时,因其肌肉薄,竖刺容易穿透胸腔,将药液打入胸腔,引起死亡。所以,应顺着胸骨方向,在胸骨旁边刺入之后,回抽针芯以抽不动为准(说明针头在肌肉中),这时再用力推动针管注入药液。药液多时不要在同一点注射。因禽的肌肉比猪、牛等的肌肉薄,若在一点打入多量药液,易引起局部肌肉损伤,也不利于药物快速吸收,应将药液分次多点注入肌肉。

来源:安徽农网