

使用抗生素治疗无效等可以做出初步诊断,确诊还应该通过实验室诊断。

本病目前无有效的防治方法,由于绵羊有传播本病的可能,在本病的发生地区,禁止牛和羊同群放牧或相互接触,发现病畜应立即隔离、消毒和对症治疗。应用抗菌素和局部治疗以防止继发感染。

诊断时注意与本病有相似症状的疾病,要加以区分。口蹄疫有传染性,传播迅速,病牛口腔黏膜有水疱、糜烂,流涎。蹄趾间、乳头部位也有水疱糜烂,眼鼻不发炎,不流分泌物。牛病毒性腹泻多发生于 6~18 月龄的犊牛,自然感染的潜伏期为 7~10 d,患病牛以黏膜发炎、糜烂、坏死和腹泻为特征。牛传染性鼻气管炎口腔无病变,不流涎,角膜不发炎,无溃疡,不发生腹泻。牛蓝舌病口唇水肿,褪色苍白,腿僵硬跛行,蹄叶炎甚至蹄壳脱落。牛副流感鼻镜干无糜烂,口黏膜无丘疹、糜烂、不流涎;角膜无溃疡。

4 防 治

预防本病主要是加强牛场的饲养管理,增强牛的抵抗力,注意清理栏舍的脏物,保持卫生。如果牛场是不仅养牛,同时还饲养羊的环境,则一定要分开饲养,分群放牧,避免直接或间接接触。另外,应该避免从发生过本病的地区引入绵羊。发现病畜后按照防疫法的有关规定,采取控制疫病蔓

延的扑杀措施。

有治疗价值的可使用龙胆草、黄芩、车前草、柴胡、地骨皮、淡竹叶各 60 g,僵蚕、薄荷、板蓝根、牛蒡子、二花、玄参、连翘各 30 g,栀子 45 g,茵陈 120 g 水煎服,1 次 /d。有眼睛病变的先用 2%的硼酸溶液冲洗,再用金霉素眼膏或氯霉素眼药水点眼。控制继发感染使用磺胺嘧啶注射液 100 mL,一次肌肉注射,2 次 /d,连用 5 d,首次量加倍。同时配合强心补液及其他对症治疗。

或者服用“龙胆泻肝汤”,处方为黄芩、龙胆草各 60 g,薄荷 30 g,茵陈 12%,柴胡 60 g,牛蒡子、僵蚕和板蓝根各 30 g,栀子 45 g,双花、连翘、玄参各 30 g,淡竹叶、车前草、地骨皮各 60 g,共煎汤,每日灌服 1 剂,连用 3~5 d 可有明显疗效。

参 考 文 献

- [1] 刘文杰.牛恶性卡他热的防控[J].畜牧与饲料科学,2011(5): 102-103.
- [2] 高巍.肉牛恶性卡他热的流行、症状及防治[J].现代畜牧科技, 2016(7):113.
- [3] 朱绍宋,促荣庆.牛恶性卡他热病例[J].中国兽医杂志,1993 (12):34.
- [4] 高明辉,高龙.牛恶性卡他热的治疗[J].畜牧兽医科技信息,1995 (8):4.

养鸡三戒

1)原粮喂鸡。有些养鸡户习惯用玉米或稻谷等原粮喂鸡,这样既降低饲料的利用率,又对鸡有害。正确喂法:将玉米等原粮粉碎,按配方搭配其他原料,如麸皮、豆饼、鱼粉、骨粉、石粉等,再喂鸡。

2)肛门摸蛋。有些养鸡户习惯用手伸入鸡肛门摸蛋,这样做很不好,因手指不卫生,易将细菌带入鸡体,造成局部发炎、红肿、破裂、脱肛等。

3)突然更换饲料。目前大多数养鸡专业户普遍采用全价配合饲料喂鸡,可一些人一听说某种饲料如何好,便立即换用新饲料,结果是产蛋率不但没有提高,反而持续下降。原因是鸡对所采食的饲料有习惯性,若突然更换,将影响鸡的食欲和产蛋量。

来源:中国农业推广网