

肉兔养殖的注意事项

佐·德力格尔¹ 徐国祝¹ 袁德军² 成书伟²

1.新疆维吾尔自治区博乐市动物疾病控制与诊断中心,新疆博乐 833400;

2.新疆维吾尔自治区博乐市畜牧兽医站,新疆博乐 833400

摘要 为了提高肉兔养殖经济效益,需要对养殖户进行技术培训,选址建舍要先规划,选养品种要优良,养殖规模要适度,饲养方法要科学,公母比例要合理,仔兔培育要过关,卫生消毒要彻底,疾病防疫要给力。

关键词 肉兔;养兔“九要”;仔兔“三关”

近年来,随着人们生活水平的提高和产业结构调整不断深入,博州地区有不少人搞起了特色养殖,肉兔养殖发展尤其迅速。少数养殖户得到了实惠,但大部分养殖户投进去的多,赚回来的少。如何提高肉兔养殖效益是养殖户需要关注的问题,笔者就肉兔养殖应注意的几个问题作一简要阐述。

1 科技培训要先行

首先,要通过培训掌握养兔的基本知识,如兔

的生活习性、品种特点、饲料来源与配制、兔舍和兔笼的建造、科学繁殖技术、饲养管理技术、疾病防治知识和技能。

2 选址建舍要规划

兔场选址合理与否直接关系到养兔的成败,合理的布局有利于兔群的生长和日常管理。场址需背风向阳、干燥、通风,水源清洁充足、清污便利。舍内设计要符合冬暖夏凉的要求,舍内地面及运动场要

收稿日期:2016-09-01

佐·德力格尔,女,1974年生,高级兽医师。

肉羊的养殖饲料,养殖户可以将其进行加工,保存起来,既节约成本,又能够提升经济效益。同时,在饲料喂养方面也需要注意,遵循少加勤添,先粗后精的喂养顺序,注重饲料的质量,不能混进杂质,影响羊只的生长^[3]。

3)此外,羊只的饮水也要进行合理控制。要经常更换清洁饮水,不能出现断水的情况。在肉羊的饲养中,还有一点要特别注意的,那就是根据羊的身体素质,定期为其补充盐分。羊只经常补充钙、磷、钠和氯等常量元素以及铁、铜、锰、锌、硒等微量元素,能够保持羊体内的电解质平衡,可以预防羊只矿物质营养缺乏症,对其生长和营养吸收都有益处,一般来说,养殖户都是使用让羊只自由舔食盐砖的方法,简单易行,且效果很好。

4)饲养管理方面。需要对羊舍进行合理规划,若一个羊舍中羊只过多会使羊的采食、休息等受到影响,不利于羊的生长,所以要根据羊舍的面积计

算出羊只的存栏量,以投放最佳数量的羊只,保证养殖的质量^[4]。

在投放羊只的过程中不能随意投放,要从整体出发,按公母强弱进行分群,为弱势群体创造生长条件,提高育肥的整体效果。除此之外,也要保证羊只的活动量,经常驱使它们进行适量的运动,对于增强食欲有很大的好处,同时也能增强羊只体质,确保健康,减少损失。

参 考 文 献

- [1] 夏晓平,李秉龙.中国肉羊产业发展存在的矛盾及对策[J].农村实用技术,2014(4):13-14.
- [2] 张志义.转变观念科学养羊[J].农村科技,2006(1):41-42.
- [3] 李跻.我国肉羊产业发展中存在的问题及对策[J].农业科学研究,2010(3):69-71.
- [4] 王兆丹,魏益民,郭波莉,等.中国肉羊产业的现状与发展趋势分析[J].中国畜牧杂志,2009(10):19-23.

硬化。有条件的最好笼养。

3 选养品种要优良

选择优良品种是在养殖中减少损失,获得高效益的前提。在选种前,要认真了解和分析人们消费的需求,根据他们的消费习惯来确定饲养的品种,并详细查阅品系、生产性能等档案资料。不要随便从市场上购买退化和杂交兔。优良品种与一般品种的生产性能相差很大,劣质品种没有经济效益。切记,选种时不要贪图便宜,因小失大。

4 养殖规模要适度

掌握适度规模养殖至关重要。要与当地市场需求、自己的技术水平、资金、人力等条件相适应。刚起步时,因饲养管理水平低下、养殖经验缺乏,抗风险能力不强,规模宜小;在饲养管理、疫病防治、卫生消毒、日粮配制及销售等各方面取得成功经验的基础上,上规模,要效益。

5 饲养方法要科学

根据兔的品种特点、生活习性、日龄差异等因素,配制合理的全价饲料,以提高饲养报酬。兔是草食动物,以青草为主。若企望兔长得快,而过多添补精料,不仅会增加饲料费用,造成浪费,还会加重兔的肠道负担,引发消化疾病。

6 公母比例要合理

合理的公母比例在 1:3~1:5。公兔过少,配种负担重,缩短种用年限,降低种用价值;公兔过多,会造成食粮浪费,增加不必要的开支。

7 仔兔培育要过关

1)初乳关。初乳中有许多母源抗体,能保护仔兔免受多种疾病的侵袭,增强抗病能力,所以要尽早让初生仔兔吃上初乳。

2)补料关。仔兔 18 日龄左右时,可让其开始吃饲料。先喂给一些易消化且营养丰富的饲料,如豆浆、豆腐和细碎的嫩草、青菜叶等。做到少喂多餐,逐渐增加,5~6 次/d。在开食初期以母乳为主,饲料为辅,缓慢转变,使其慢慢适应。

3)断奶关。仔兔到 40~45 日龄时可断奶。过早断奶,仔兔的消化系统没有发育成熟,对饲料的消化能力差,不仅影响生长,死亡率也高;断奶过迟,仔兔也会因消化酶形成缓慢而影响生长,降低效益。

8 卫生消毒要彻底

要建立严格的消毒制度。开始养兔时和每年开春后,兔舍、笼具、食槽及饲养场地要彻底清扫消毒。平时做到每天仔细清扫 1 次,每周消毒 1 次。消毒时,尽量选择广谱、高效、低毒的消毒剂,如百毒杀、杀特灵、消毒灵、除菌净等,且多种消毒药轮换使用。

9 疾病防疫要给力

仔兔断奶 7~10 d 后,应注射兔瘟疫苗,每只兔 1 mL;隔 10 d 后,再注射 1 次兔瘟、巴氏杆菌、魏氏梭菌三联苗,每只兔 2 mL。以后每 4 个月注射 1 次三联苗。注射疫苗要做好消毒工作,一兔一针,严禁混用,以免人为传染。同时,断奶以后至 3 月龄的兔要特别注重兔球虫病的防治。

绒山羊选配的原则

- 一是公羊优于母羊。为母羊选配公羊时,在综合品质和等级方面必须优于母羊。
- 二是以公羊优点补母羊缺点。为具有某些方面缺点和不足的母羊选配公羊时,必须选择在这方面有突出优点的公羊与之配种,决不可用具有相同缺点的公羊与之配种。
- 三是慎用亲缘选配。
- 四是及时总结分析。如果效果良好,可按原方案再次进行选配;否则,应修正原选配方案,另换公羊进行选配。

来源:河北农科 110 网