

犬急性胃炎的诊治

刘永乐 李吉超 吕英超

山东省威海市文登区高村畜牧兽医工作站, 山东威海 264400

摘要 致使犬类出现急性胃炎的原因较多, 本文分析了犬类 2 种不同类型的急性胃炎发病原因、致病机理、临床症状、诊断要点以及治疗方法, 以此归纳出犬急性胃炎科学合理的诊断及治疗方案。

关键词 犬; 急性胃炎; 诊断; 治疗

犬急性胃炎较为常见, 但由于犬的体能机制及种类的不同, 患病症状各有差异, 需要根据实际的病理情况进行诊断, 同时做好治疗方案研究, 以便选择适宜的治疗方式。

1 病因分析

急性胃炎有 2 种, 即原发性急性胃炎及继发性急性胃炎, 导致原发性急性胃炎较为常见的原因是食物及饮水安全问题, 使细菌滋生对胃部造成严重刺激, 同时因误食有毒植物及粗纤维过多的食物, 也易引起该疾病。引起继发性急性胃炎的原因主要是传染病及食物中毒, 器官疾病也容易引起继发性急性胃炎。

2 致病机理

主要是对胃部黏膜刺激过大, 导致其发生充血的状况, 因未能及时治疗, 充血状况不断加重进而渗入胃部, 胃黏液的分泌随之减少, 使所食用的食物无法得到分解, 从而发生病变, 引起呕吐等过激刺激症状。

3 临床症状

患病初期, 易出现食欲不振及拒绝进食的情况, 同时伴有一定程度的呕吐, 呕吐物中明显带有血丝、血液及脓汁。在精神状况方面, 易出现精神萎靡不振、低迷沉郁。在患病达到一段时间后, 会出现较为严重的脱水现象, 体重随之迅速下降, 体温

波动不定, 在饮水后易出现呕水现象。

4 诊断要点

首先了解犬的饮食习惯, 并对食物进行进一步检查。如食物中未出现安全问题, 则需进行胃窥镜检查, 有胃黏膜充血、斑块及肿胀或糜烂时, 则可进行初步判断。为进一步提高诊断准确性, 可进行 X 线摄影检查, 通常可发现异物阴影, 在加入对比剂后, 可清晰地观察到溃疡位置。

5 病程及预后

原发性急性胃炎治疗难度较小, 通常在 1~2 周内可康复。而继发性急性胃炎则需根据实际的病理情况进行治疗, 康复周期不可测。

6 治疗方法

1) 饮食疗法。由食物引起的轻度胃炎, 应禁食 24 h, 尽量限制饮水。之后, 给予青菜汤、温热牛奶、稀饭等易消化的食物。应注意少食多餐。

2) 排除毒物。病初时胃内尚残留有毒有害物质的, 可用盐酸阿朴吗啡 2~10 mg, 皮下注射, 或用其 1% 的水溶液灌服。有毒物质入肠道难以吐出时, 经口灌服蓖麻油 15~60 mL。

3) 顽固性呕吐。用氯丙嗪 1 mg/kg 肌肉注射。也可口服胃复宁 1~2 片, 2 次/d。

4) 增加食欲, 健胃止痛。可投服橙皮酊、稀盐酸、苦味酊、人工盐、乳酶生等。