

肉鹅滩涂放养要领

张 青

江苏省金湖县动物疫病预防控制中心, 江苏金湖 211600

金湖是美丽的苏北水乡, 拥有水面 420 km², 滩涂面积 44 km²。淮河入江水道自西向东贯穿腹地, 境内水面广阔, 水生饲料资源及野草资源丰富, 独特的地理条件特别适合水禽放养。在肉鹅养殖向规模化、集约化、产业化发展的背景下, 充分利用地方滩涂资源, 发展放牧肉鹅, 不仅节约饲料成本, 而且可提高肉鹅的品质。放养肉鹅还具有投资小、收益高、灵活性高等优点, 放养肉鹅由于口味好而供不应求, 帮助众多养鹅户获取了较高的养殖效益, 仅金湖淮河入江水道年出栏商品肉鹅就达到 50 多万羽。笔者认为要想在滩涂环境中养好肉鹅, 就必须重视以下几个要领。

1 放养地选择

1) 为了保证肉鹅的健康, 在选择放养地点时, 首先要考虑周边有无其他水禽养殖场和各种污染源。为了防止疾病相互传播, 应尽量远离其他水禽养殖场, 相互距离应保持在 2 km 以上。

2) 放养场址应选择交通方便, 临近水源且水源水面宽阔、水质良好, 天然牧草和水草丰富的地方; 同时要求选择地势高燥、平坦的地方, 土质以透水的沙壤土为宜。

2 棚舍搭建

可根据地理条件, 选择地势较高, 方位朝南或偏

东南、背风向阳的地方搭建棚舍。鹅舍的建造, 总的要求是冬暖夏凉, 阳光充足, 空气流通, 干燥防潮, 经济耐用, 且搭建在靠近水源、地势较高、有一定坡度的地方。材料一般选择竹木结构, 条件好的可选用组装的钢架结构; 棚舍面积根据饲养量而定, 以每平方米栖息 7~8 只肉鹅计算, 每栋以 80 m² 左右为宜。育雏时可在舍内分隔出几个圈栏, 每一圈栏面积为 10~12 m², 可容纳 3 周龄以内的雏鹅 100 只。

3 苗鹅选择

选择到信誉较好的孵化场选购苗鹅, 首先看鹅苗是否来自健康、生产性能高的种鹅群, 是否符合所需要品种的特性和特征; 其次要选择活力好、整齐度高的鹅苗, 不能一味追求低价格, 要树立质量第一的思想。扬州肉鹅具有生长速度快、肉质好、耐粗饲、适应性强、肉质鲜美等优点, 70 日龄平均活重可达 3.5 kg 左右, 因此推荐养殖扬州肉鹅。

4 免疫预防

规模养鹅效益高低看管理, 成败与否看防疫。肉鹅生长快、饲养周期短, 70 d 左右就可上市, 因此防疫工作也要根据生产周期特点合理安排。为保证肉品安全, 在上市前 1 个月一般不应接种疫苗和使用药物预防。免疫程序最好根据地方疫病流行情况及本场的病史制定。一般情况下, 刚出壳的雏鹅要

收稿日期: 2014-03-06

张 青, 女, 1978 年生, 助理兽医师。

员进出猪舍严格消毒; 每天打扫猪舍卫生, 并用石灰水、过氧乙酸等消毒药品早、晚各消毒 1 次; 保持料槽、水槽干净, 地面清洁。

2) 做好免疫接种。每年定期进行猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗等的免疫接种

工作, 严格按免疫技术规程规范操作。

3) 驱虫。用高效、低毒、无残留的驱虫药进行体内外寄生虫病的防治, 每年 2 次。

4) 及时治疗。发现患病的猪及时隔离并进行治疗。

及时用小鹅瘟抗血清,每羽肌肉注射 0.02 mL,以有效预防小鹅瘟;5 日龄,每羽肌肉注射鹅副黏病毒疫苗 1 mL;21 日龄,每羽肌肉注射禽流感疫苗 1 mL;30 日龄左右,每羽肌肉注射禽霍乱疫苗 1.5 mL。饲养用具每天清洗、消毒 1 次,鹅舍和活动场地每周用 1%漂白粉、2%烧碱交叉消毒 1 次。仔鹅在育肥前进行大小分群,并用阿维菌素驱虫。

5 搞好驯养

放养鹅群,抓好鹅群驯养工作很关键。喂食、放牧时要发出不同信号,使鹅群形成条件反射,听从指挥;要能够尽快在鹅群中发现头鹅,做好标记,驯养好头鹅可有效指挥鹅群。

6 抓好育雏

出壳 1 d 后的雏鹅,可用切碎的鲜嫩菜叶诱食。开食后,先调教饮水,以后每隔 2 h 左右饲喂 1 次,一般喂至 7 成饱即可。3 d 后,可用料槽喂料,每日喂 4~5 次,夜间 10:00 左右补喂 1 次。6~10 日龄的雏鹅,每日喂 6~8 次,其中夜间补喂 2 次。到 11~20 日龄,日喂 5~6 次,其中夜间补喂 2 次,白天可适当进行放牧。21~30 日龄开始,每日喂 3~4 次,并逐渐延长放牧时间。注意每次喂料量均以 8 成饱为准,同时要供给充足饮水。育雏料一般选用营养较高的颗粒饲料;更换饲料时要注意逐渐过渡。

7 中鹅粗养

肉鹅 30 日龄后至主翼羽长出前为中鹅期,是长骨骼、肌肉和羽毛阶段,饲养管理以放牧为主。根据肉鹅早晨和傍晚采食比较旺盛的特点,放牧要早出晚归,早晚补充足量精料。放牧地点要有计划地

轮换使用。

8 售前催肥

扬州肉鹅一般饲养 70~80 d 即可上市,自 50 多日龄起可进行强化育肥,加大精饲料喂量;肉鹅主翼羽长出后,即可开始催肥速养。催肥期饲料要多样化,根据情况增加精料使用次数,每日喂 4~5 次,并供足饮水。一般经 15~20 d 催肥,手摸胸肌丰满、背部脂肪增厚,即可上市出售或宰杀。

9 青饲料供给

鹅属草食家禽,优质饲草可占日粮供应的 80%~90%。放养者可根据生产情况首先选择利用滩地牧草以及湖中水草,自然草料不足时可到农贸市场选择各类青绿菜叶作为补充。

10 日常管理

1) 注意搞好环境卫生与消毒工作,尽量不让无关人员进入养殖场,养殖人员不要随意到地方活禽市场或其他养禽场,运输工具、人员进入养殖场地必须严格消毒。

2) 要防止敌害动物侵害鹅群,主要是鼠、黄鼠狼、蛇等的侵害,夜晚尤其要做好防范措施。

3) 在养殖过程中要防止应激,不要惊扰鹅群,要让其安静休息;暴雨前要及时将鹅群赶入圈舍,以防感冒。

4) 及时处理病死鹅,不要随意乱丢,要按照防疫要求进行无害化处理,以免病原扩散。

5) 发现鹅群有发病征候,要及时到当地兽医部门求诊,不要以经验自己随意治疗,以免耽误最佳治疗时机。