

提高羔羊成活率的关键措施

廖海洋

福建省清流县畜牧兽医水产局,福建清流 365300

摘要 羔羊的成活率事关山羊养殖效益,本文从母羊与羔羊 2 个方面介绍了提高羔羊成活率的措施。

关键词 羔羊;成活率;措施

在山区,由于森林覆盖率高,天然牧草资源与可利用廉价农作物秸秆资源丰富,是进行山羊放牧饲养、增加农民收入的理想区域。但在山羊放牧饲养过程中,如何提高山羊羔羊成活率,是保障山羊养殖经济效益的重要措施之一。笔者在工作实践中,引导山羊养殖户采取以下措施,做好母羊和羔羊的饲养管理工作,对提高羔羊成活率取得了理想效果,现将该技术措施介绍如下。

1 母羊方面

1.1 科学安排母羊的配种时间

为了让羔羊在温度适宜、青绿牧草多的季节出生,以利羔羊生长发育,提高成活率,在山羊放牧养殖过程中,要有计划地不让公羊在 2~3 月份、8~9 月份配种,安排其余时间配种,以达到母羊在 3~5 月份与 9~11 月份产羔的目的,具体方法是限制公羊与母羊进行接触。

1.2 做好母羊免疫工作

依照山羊免疫程序,做好母羊的传染性胸膜肺炎、三联四防等免疫注射工作,根据周边区域的疫情情况,做好羊痘、小反刍兽疫等病种免疫工作。没有进行三联四防免疫注射的,应在母羊产前 1 个月进行补免,以便使羔羊出生后通过吃奶获得被动免疫。

1.3 做好母羊怀孕期的饲养管理

在母羊怀孕期,一是不要让母羊剧烈运动,以防母羊流产;二是要做好放牧工作,让母羊采食足量的优质青草;三是每天羊群收牧后,给怀孕母羊

补饲豆科草料或营养全面的配合饲料;四是要让母羊舔食足量的营养舔砖,以保障母羊对微量元素、矿物质等的营养需要。

1.4 要满足母羊哺乳前期的营养需要

母羊产后,即进入哺乳期,在母羊哺乳前期,要让母羊采食足量青绿多汁的草料,每天在收牧后,要给母羊补饲豆科草料或营养全面的精料,并注意让母羊舔食足量的营养舔砖,以满足其对各种营养成分的需要。

2 羔羊方面

2.1 做好接产工作

母羊一般能顺利分娩,但在母羊分娩日期到来时,还是要做好接产工作,准备碘酊、酒精、水盆、干燥毛巾等接产物品。在母羊进行分娩时,要注意观察,如果母羊发生胎位不正及难产,要及时进行人工助产。

2.2 做好护理工作

羔羊产出后,要让母羊舔净羔羊身上的黏液等物,如果母羊未舔的,接产人员要及时用布将其擦净,并一同掏出、擦净羔羊口腔、鼻腔里的黏液等,剪断脐带,用碘酒消毒处理。

2.3 让羔羊尽早吃到初乳

羔羊出生后,有天生吃乳的能力,但是,如果发现羔羊没有尽早吃初乳时,要人为协助,让羔羊在产后 1 h 内吃足初乳。

2.4 做好羔羊寄养工作

羔羊出生后,如果是产 3 只以上的,要进行寄

肉羊的饲养管理技术要点

乔清亮¹ 王远丽²

1.新疆维吾尔自治区吉木萨尔县泉子街镇畜牧兽医站,新疆吉木萨尔 831700;

2.新疆维吾尔自治区昌吉州畜产品质量安全检测中心,新疆昌吉 831100

摘要 做好肉羊养殖必须注入现代养殖技术。分别介绍了羔羊、育成羊、种公羊、母羊的饲养管理技术要点。

关键词 肉羊;饲养管理;技术要点

当前,随着肉羊杂交改良技术的运用,肉羊养殖已被广大养殖户所接受,肉羊养殖成为增加农牧民收入的一项经济来源。做好肉羊养殖必须注入现代养殖技术。

1 羔羊饲养

1)及时吃足初乳。羔羊出生后 2~4 h 以内,要尽快吃到初乳。

2)适时断乳、去势。羔羊在生后 10~15 d,要训练羔羊吃草吃料,促进前胃发育,先以青干草为主,以后以碾碎的玉米、豆粕为主。羔羊出生 60~90 d 后,要把母仔分开断奶,使母羊早日恢复体质,锻炼羔羊的独立性。羔羊应在断奶前去势,越早越有利于恢复。

3)对缺奶羔羊或失去母羊的羔羊,要找母性强的保姆羊,将保姆羊的羊奶或者尿液涂在寄养羔羊

的身上,使母羊难以辨认而进行哺乳。也可用奶粉或者消毒的牛、羊奶进行人工哺乳,做到定时、定温、定量。

4)做好羔羊的保健。北方冬季寒冷,要注意羔羊的保暖,防止贼风进入羔羊圈舍,夏季要防暑降温,注意通风。羔羊合理哺乳,加强运动,增强体质。保持舍内干燥,清洁卫生。

2 育成羊饲养

1)分群管理。按照公母、大小、体质强弱进行分群管理,及时转群饲养。按照不同的情况来调配饲料。

2)防疫与驱虫。制定科学的免疫程序和预防接种;90 日龄进行第 1 次驱虫及免疫接种,必要时在 135 日龄进行第 2 次驱虫。按照免疫程序进行免疫接种及驱虫。

收稿日期:2015-04-03

乔清亮,男,1978 年生,兽医师。

养,寄养前,要让羔羊吃足初乳,再进行寄养。

2.5 补饲精料

为了满足羔羊生长发育的需要,羊群每天收牧后,要给羔羊补饲一些精料,如全价颗粒饲料、麦皮、玉米等。

2.6 做好羔羊疫病防控工作

1)做好羊舍卫生。对有产羔羊的羊舍,要坚持每天对粪便及污物进行清扫,清扫后的粪便及污物堆积进行发酵处理。每周对羊舍进行 1 次消毒。

2)给羔羊喂食预防药物。羔羊出生后,对原有发生过羔羊痢疾的羊场,出生 3 d 后,每天要给羔

羊喂食土霉素片等,以预防羔羊痢疾等肠道疾病的发生。

3)做好羔羊疫病免疫工作。在羔羊饲养过程中,要依照羊疫病免疫程序,及时对羔羊进行相关疫病的免疫注射,除传染性胸膜肺炎外,其余病种要根据周边的疫情来确定。

4)做好病羊救治工作。在羔羊饲养过程中,要坚持每天查看羔羊的健康状况,以便及时发现异常与发病的羔羊,一旦发现羔羊发病,要及时采取措施进行治疗处理,将疫病控制在萌芽状态,以最大限度降低羊场损失。