

夏季肉鸡饲养管理技术

李 东

广西壮族自治区田东县印茶镇水产畜牧兽医站, 广西田东 531506

夏季气温较高,肉鸡的饲养管理主要在于防暑降温。笔者经过多年的实践,对夏季肉鸡的饲养管理积累了一定的经验,现介绍如下。

1 入夏前的准备

1.1 搞好绿化

绿化是一项长远的防暑降温工作,要求以苦楝木、牵牛花为主。苦楝木的种植要离鸡舍 2.5 m 左右,树与树之间 3~4 m 为宜,每棵树占地约 10 m²;牵牛花以每笼鸡 4 棵为宜,并用竹片夹好,防止鸡啄。

1.2 搭建凉棚

新鸡舍绿化差的,要及时搭好凉棚并在西射阳光的一边拉上密度好的遮阳网。凉棚要求高 1.8~2.0 m,宽 3.0~4.0 m。

1.3 改造鸡舍

一是没有屋檐的鸡舍应拉遮阳网,窗户和门也应搭遮阳设备,以防阳光直射入鸡舍。二是入夏前用“白石灰+白水泥+水”把鸡舍瓦面喷白,这样可以使舍内温度降低 2~4 ℃。三是搞通鸡舍的天窗及地脚窗来加强通风。四是整改好彩条布,要求正确通风换气,由上到下成一条直线。五是对于防暑降温达不到要求的必须配备电风扇,要求每 1 000 只鸡配 1 个电风扇。六是整改好运动场,必须彻底清理运动场杂草杂物;对运动场有积水的地方必须填平;用板条等围好运动场,防止意外事故发生;疏通好排水沟,有条件的应加铺石灰水泥。

1.4 完善供水系统

要求装上自动饮水系统,每笼鸡要 3 只水壶以上;自动饮水的大水桶必须有遮阴设备,而且鸡舍外的水管必须要埋在地下或用稻草等物品遮盖,防

止日晒,并做到勤抽勤换(1~2 h 换 1 次),以保持水的清凉,防止水温过高。充分利用好运动场,并且将部分料桶、饮水器搬到运动场。

2 抓好鸡群的常规管理

2.1 及时扩栏和分群

扩栏和分群可以确保鸡只有充足的活动空间,降低鸡群的饲养密度,以改善鸡舍内温度、提高鸡群的均匀度、降低料肉比。

分别在鸡只 4、9、15 及 20 日龄时进行扩栏,并且要求矮脚黄和新兴黄鸡在 14~16 日龄断喙、分公母,20 日龄注射疫苗时再分 1 次公母;竹丝鸡在 28~30 日龄断喙,40 日龄注射疫苗时把大小鸡分开,在 50~60 日龄时再分公母;土鸡在 45~50 日龄断喙,65 日龄注射疫苗时把公鸡挑出。

2.2 做好鸡群的分笼工作

细分笼位可以确保鸡群的饲养密度均衡并减少鸡群的应激,确保每只鸡都有充足的料量,保证鸡只正常生长,提高肉鸡的均匀度,降低料肉比,降低饲养成本,提高只毛利,更重要的是可以减少鸡群因受惊而出现打堆压死鸡的现象。

1)在进苗时,分为 400~500 只/笼或更少,并将弱雏挑出另外饲养,加强护理。

2)扩栏后,黄鸡类要求分为 1 000 只/笼或更少,竹丝鸡要求分为约 600 只/笼。

3)加强对次弱鸡只的管理。在每次扩栏、分群及接种疫苗时,将次弱鸡只挑出另外饲养,加强护理;另外,对护理不好的、较差的及软脚或跛脚的,在 45 日龄前要尽快淘汰掉,减少耗料,降低成本。

2.3 加强对垫料的管理

夏季对垫料的管理更加严格,垫料的好坏、合

格与否直接关系到防暑降温的效果,一般垫料厚度控制在 1 cm 以内且要勤清勤换。也可以在垫料中添加河沙(30%左右),要将河沙先用消毒药水清洗后再平铺在鸡舍内,高温天气、鸡群张嘴呼吸严重时可适当淋水,这样既可降低舍内温度,又可给鸡只提供一清凉的栖息地,喷湿后的晚上或第 2 天早上清除;如果天气仍然炎热,就暂时不用加垫料,作喷水处理用;如果天气不再炎热,就要再加上 1 cm 厚的垫料。

2.4 饲喂方法

采用早晚(早上 6:00~7:00,晚上 19:00~20:00 为宜)多喂料的方法,且晚餐的前半夜要增加光照,以刺激鸡群采食;中午可以适当喂些湿料。但必须注意,喂湿料时不能喂的时间过长(每餐在 0.5~1.0 h 为宜,以少喂勤添为主),要少食多餐,而且不能拌得过湿,以手握不出水、手松能散开为好,防止饲料发酸变质。另外,饲料内添加生大蒜等方式可增加鸡群采食量。

2.5 其他措施

1)通风。彩条布从上到下都要全部卷在一起,成一直线;所有地脚窗要打开,加强通风;对于绿化差的鸡舍必须安装风扇等设备,以增大空气流量,在风扇前喷洒加有风油精的水效果更好。

2)充分利用运动场。运动场绿化好的,一定要及时放出鸡,并且在每天放鸡之前淋湿(或消毒)1 次干燥的运动场,而且要拿一部分饮水器、料桶到运动场。

3)注意药物的使用。在中午时,不能在饮水或饲料中喂一些带苦味的药物,防止鸡群少饮少食而造成中暑。建议喂一些防应激的药物,如维生素 C、0.2%~0.3%小苏打、0.1%的氯化铵、5%的葡萄糖等。

4)保证鸡群有充足的饮水。要求每笼至少装有 3 个自动饮水壶,自动饮水器的水要加深。

5)喷淋降温。喷淋降温是最常用的方法,一般分舍外和舍内 2 种。一是屋顶淋水法:鸡舍周围地下水水源充足的,用清水泵抽水喷淋鸡舍屋顶及外墙。在操作中要注意,要在鸡舍石棉瓦及墙壁未晒

热前喷水,且一定要喷湿喷透。二是运动场淋水法:在炎热的夏天,运动场喷水,可有效降低空气中的温度,使吹进鸡舍的空气变凉,降低鸡舍温度。三是鸡舍内带鸡喷淋法:在夏天的下午,温度高于 32 °C 时,鸡群的生长将受到抑制,并可能会出现大范围的中暑,这时候就必须带鸡喷水(水中加风油精效果更好),要求在中午 12:00 就开始喷水(要求喷到垫料湿为好),然后每隔 1 h 再喷 1 次,直至下午 17:00 时气温下降后止。

3 加强防疫消毒

夏季气温较高,是细菌和蚊虫滋生的季节,是肠炎、卡氏住白细胞虫病(白冠病)、螨虫病和呼吸道病的高发季节。因此,必须要注意日夜温差,搞好通风,搞好舍内的垫料卫生和舍外的环境卫生,同时还要搞好饮水卫生;经常进行带鸡消毒和环境消毒;定期进行灭蚊、灭鼠、灭虫。

4 鸡群的日常保健和发生中暑后的处理

1)在天气炎热的时候,可适当投喂电解质和维生素,如小苏打、维生素 C、葡萄糖等,据笔者多年的经验,黄糖绿豆甘草汤有着很好的保健和防暑功效,其配比为:黄糖 2.5 kg、绿豆 3.5 kg、甘草 1.5 kg。

2)发生中暑后的处理。首先,要抽水淋湿鸡舍地面及垫料,并加强通风,利于鸡群散热,第 2 天早上清除垫料;中暑严重的,要马上挑出并浸于凉水中,并且要浸得鸡体退热后才拿出放于阴凉处。其次,要对鸡舍内鸡群实行喷水降温。用 5 小瓶风油精或 1 瓶醋精兑 1 桶水喷洒鸡群;也可用十滴水,饮用按 3 盒 /250kg 水,带鸡喷雾按 5 盒 /20kg 水;急用时也可用清水。最后,对中暑鸡群要喂一些防应激药物,如 5%葡萄糖水、维生素 C、“体脱康”等;另外,第 2 天还要喂一些预防肠炎的药物。