

妊娠期种母兔的饲养管理

孙海燕¹ 孙云山²

1. 山东省蒙阴县旧寨乡旧寨兽医站, 山东蒙阴 276212; 2. 山东省蒙阴县垛庄镇垛庄兽医站, 山东蒙阴 276225

摘要 母兔的饲养管理以妊娠期最为重要, 妊娠母兔的饲养管理重点是加强妊娠后期的营养、防止流产、做好产前及接产准备工作和产后管理。

关键词 母兔; 妊娠; 流产; 饲养管理

兔是多胎多产的草食家畜, 繁殖力强。养好母兔的目的, 在于提供数量多且品质好的仔兔。为了提高生产效益、发展养兔生产, 必须不断提高母兔的生产指标, 而改进饲养管理是最直接有效的手段。种母兔妊娠期的饲养管理尤为重要, 其营养消耗大, 特别是妊娠后期对营养的需求更大。因此, 应做好妊娠后期种母兔的饲养管理, 以确保养殖效益。

妊娠母兔是指从母兔自交配后受胎到分娩产仔这段时间的母兔, 周期为 30~31 d。饲养重点是加强妊娠后期营养, 防止流产和做好产前的准备工作^[1]。

1 加强母兔妊娠后期的营养

母兔妊娠前期(1~20 d), 胎儿组织增长很慢, 所需营养物质不多, 这个时期采取限食的方式, 无需加强饲养; 妊娠后期(21~31 d), 胎儿和胎盘生长迅速, 母兔的营养需求增多, 应适当提高营养水平, 可采取自由采食的方式饲喂。母兔临产前 3 d 要减少精料的喂量, 增加青绿饲料的喂量^[2]。妊娠后期增加营养不仅能使胎儿正常生长, 而且可以增强母兔体质, 提高泌乳量。

2 防止流产

流产一般发生在妊娠后 15~25 d, 尤其以 25 d 左右多发。引起流产的原因有多种, 如妊娠母兔受到过度惊吓时, 容易到处冲撞, 从而导致流产; 摸胎粗暴、妊娠诊断技术不熟练, 不能正确辨别胚胎, 容易

捏死胚胎; 饲喂发霉的饲料或饲料饲喂过多清理不及时导致霉变, 都会影响胎儿的发育, 最终引起流产; 另外还有疾病、微量元素的缺乏等因素都可能引起流产, 应针对不同的原因, 采取相应的预防措施。

3 做好产前及接产准备工作

根据孕兔预产期提前 3 d 放好产箱, 产箱应清洁, 铺上柔软的垫草。怀孕母兔在临产前 1~2 d, 食欲大减, 并开始用嘴扯下腹部毛放在产箱内, 这就是分娩的前兆。母兔生产过程中一定要保持安静和良好的生产环境, 生产过程中应有专人接生, 避免仔兔冻死、压死等现象, 生产完成后及时检查仔兔并更换垫料, 对没有吃上初乳的仔兔进行强制辅助哺乳, 对产仔数不一的母兔做好寄养工作^[3]。

4 产后管理

母兔产后由于食入胎盘和胎衣, 消化功能较差, 应饲喂易消化的饲料。分娩 1 周内, 应喂服或肌肉注射预防母兔乳房炎的药物, 减少仔兔黄尿病的发生, 提高仔兔的成活率^[4]。

参 考 文 献

- [1] 付连军. 妊娠、分娩母兔的饲养管理[J]. 北京农业, 2015(29): 121-122.
- [2] 李恒山. 种母兔的饲养管理技术[J]. 现代农业, 2015(8): 88-90.
- [3] 种母兔饲养管理[J]. 四川畜牧兽医, 2013(11): 35-36.
- [4] 封菊. 浅谈种母兔的饲养管理[J]. 畜牧兽医科技信息, 2014(6): 128.