

夏季养鸡常见病及防治方法

孟金灵

山东省郓城县畜牧兽医局, 山东郓城 274700

摘要 本文主要阐述了夏季养鸡的常见病症, 如鸡热应激、寄生虫性疾病、病毒性疾病、细菌性疾病和中毒性疾病, 并针对性地提出了防治措施, 以减少疾病的发生, 提高养殖经济效益。

关键词 鸡; 热应激; 寄生虫性疾病; 病毒性; 细菌性; 中毒性; 夏季

夏季养鸡的常见病较多, 主要有鸡热应激病、寄生虫性疾病、病毒性疾病以及细菌性疾病, 应根据不同的病症对应不同的治疗方法, 保证鸡的健康, 减少疾病带来的养殖损失。

1 鸡热应激病

夏季鸡热应激病发病率高, 虽不能影响鸡的生

长发育、产蛋率, 但影响了鸡只的新陈代谢、生理能力。可以通过物理降温的方法对鸡舍进行基础降温, 主要以遮阳、喷雾降温、通风或风扇降温的方法为主。对鸡只根据日龄进行分舍管理, 不同日龄的鸡根据日龄调节温度。鸡舍内应保障饮水不间断, 避免鸡水分流失过多。饲料中应适当降低粗蛋白的比例, 并适当添加抗氧化剂、脂类饲料; 并在饮水中

收稿日期: 2018-04-17

孟金灵, 女, 1977 年生, 助理兽医师。

的水, 防止冰冷的饮水刺激绵羊胃肠道, 导致腹泻、消化不良或其他消化道疾病。同时还应该对饮水进行灭菌处理, 防止耐寒冷的致病微生物侵袭绵羊。

2 常见病防治

1) 绵羊的常见病。绵羊的常见病主要包括病毒性传染病、寄生虫病以及细菌性传染病, 其中发病率较高的有羔羊大肠杆菌病、绵羊脑包虫病、布氏杆菌病、体外寄生虫病和体内寄生虫病。羔羊大肠杆菌病 7~30 日龄的羔羊中发病率较高, 发病急, 死亡率高。绵羊脑包虫病在 1~2 岁以下的育成羊中发病率较高, 通常是由于绦虫的多头幼虫寄生而导致患病。布氏杆菌病是一种危害十分严重的人畜共患病, 主要危害绵羊的生殖系统。绵羊的体外寄生虫包括羊虱蝇、蜱螨、蠕行搔等, 影响患病羊生长发育, 并导致贫血的现象。绵羊的体内寄生虫包括绦虫、消化道线虫、肠结节虫、多头蚴等。

2) 绵羊常见病的防治。每天清洁打扫羊舍, 保证绵羊的生存环境干净整洁, 对清理出来的粪便进行无害化处理, 减少致病微生物在羊舍内的滋生繁殖, 同时要消灭羊舍内的蚊蝇等, 防止疾病交叉感

染; 使用驱虫药物定期进行寄生虫的驱除。可以在剪毛后使用药浴的方法消灭体表寄生虫; 还要进行合理的免疫接种来预防各类传染病^[3]。此外, 要对羊蹄进行修剪, 经常洗刷皮毛, 保证体表卫生。

3 小 结

在肉用绵羊的饲养过程中, 首先应该采取措施提高绵羊的繁殖性能, 保证母羊的受孕率, 其次要加强饲养和饮水的管理。营养、饲喂程序和饮水是提高绵羊生长性能, 提高机体抵抗力的主要措施。对于肉绵羊常见病的防治, 要采取加强饲养管理、免疫接种以及使用药物的方法进行综合防治。

参 考 文 献

- [1] 董荣群. 肉绵羊养殖技术管理要点[J]. 现代畜牧科技, 2016(2): 21.
- [2] 才让卡. 舍饲肉羊高效养殖技术 [J]. 中国畜牧兽医文摘, 2015 (8): 81.
- [3] 赵天贤, 冯世武. 高原牧区绵羊多发病防治技术[J]. 畜牧兽医杂志, 2013, 32(5): 122-123.

添加复方电解多维,任其饮用。

2 寄生虫性疾病

夏季是寄生虫性疾病的高发期,其中主要以鸡球虫病、鸡白冠病为主。

1)鸡球虫病。鸡球虫病主要易感群体为 40 日龄以内的雏鸡。预防该病主要是将雏鸡进行笼养或网养,减少与传染源接触;定期对鸡舍进行清洁、消毒;在饲料中添加适量的氯苯胍、莫能霉素、尼卡巴嗪以及盐霉素等药物进行预防,可以有效降低鸡球虫病的患病率。

2)鸡白冠病。鸡白冠病的病原是鸡住白细胞原虫,危害严重,库蠓正是鸡住白细胞原虫的传播媒介。鸡白冠病的主要预防方式是灭杀库蠓,没有传播媒介,鸡白冠病的发病率就会降低。夏季库蠓数量剧增,所以需要在夏季对鸡舍进行定期杀虫处理,可以选择敌百虫或蝇毒磷对鸡舍进行消毒^[1]。

3 病毒性疾病

夏季常见的病毒性疾病主要以鸡新城疫、鸡痘病和鸡法氏囊为主。针对病毒性疾病的防控,对鸡舍进行科学化的饲养管理,对该地区的常见病毒性疾病提前注射疫苗。也可以在鸡群的饮水中添加适量的氨基酸、双黄连口服液,促进鸡群的抵抗力。

4 细菌性疾病

夏季常见的细菌性疾病主要以鸡大肠杆菌病、鸡葡萄球菌病等为主。针对细菌性疾病的防控,可以将蒜泥、糖与食醋进行混合,添加至鸡群的饮水中,连续 10 d,可以提高鸡群对细菌的抵抗力^[2]。

5 中毒性疾病

夏季常见的中毒性疾病主要是曲霉菌毒素中毒。针对曲霉菌毒素中毒的防控,应适当保存饲料,避免饲料发霉,对已经发霉的饲料进行处理,不可以给鸡群饲喂。饲料的保存期不超过 15 d,夏季梅雨期间,应该保持饲料干燥,防止饲料过潮,产生霉变^[3]。

本文从鸡热应激病、寄生虫性疾病、病毒性疾病、细菌性疾病以及中毒性疾病几个方面对夏季常见病的预防进行阐述。

参 考 文 献

[1] 郑桂华.蛋鸡夏季常见病综合防治[J].甘肃畜牧兽医,2016,46(6):85.

[2] 李中习.浅谈蛋鸡常见腹泻病及其防治 [J]. 养禽与禽病防治, 2016(2):43-45.

[3] 吴锦刚.夏季鸡群常见病及防治[J].农民致富之友,2017(11):62.

饲料引起鸡腹泻的原因

1)食盐含量过高。为增强食欲,防止啄羽、啄肛等现象发生,一些养鸡户在饲料中添加过多的食盐,这样会使鸡出现剧烈腹泻。鱼粉添加量大或鱼粉本身含盐多也容易致使饲料中的食盐含量过高,导致蛋鸡腹泻。

2)石粉添加量过高。日粮中的石粉添加量过多或增加过快,会导致蛋鸡的血钙过高,肾脏负担加重,引起肾肿,最终导致拉稀。蛋鸡日粮中的石粉一定要随着产蛋率的上升循序渐进地增加。

3)粗蛋白水平过高。有些饲养户为了让鸡多产大个蛋,常增加日粮中豆粕的添加比例。豆粕含量过高,机体吸收不完全,从而刺激肠道加快代谢,造成鸡的粪便发黄发稀。一般产蛋鸡群的粗蛋白需要量为 16%左右,蛋白含量过高或蛋白能量不平衡易造成蛋鸡的肝肾功能减弱,导致尿酸盐大量沉积甚至发生痛风症。

来源:青海农牧业信息网